

## 破傷風 予防接種説明書

予防接種を受ける前に以下をよくご覧ください。わからないことは接種を受ける前に医師にご質問ください。

### 【どんな病気？】

破傷風菌は土の中にひそんでいて、傷口から人へ感染します。転倒等の事故や土いじりによる受傷部位からの感染が多いといわれていますが、菌の侵入部位は特定できないほどの軽い傷の場合もあります。傷口から菌が入り身体の中で増えると、菌の出す毒素のために、口が開かなくなったり、けいれんをおこしたり、呼吸筋の麻痺で死亡することもあります。この病気は、人から人へ感染するのではなく土の中にいる菌が原因ですが、世界中どこでも菌はいますので、感染する機会はあります。特に衛生状態のよくない途上国では、怪我をした際、命に関わることもあります。

なお、破傷風は発症しても、その後に免疫を獲得しないため、予防接種を受けることによって初めて免疫を獲得することができます。

### 【どんなワクチン？】

破傷風トキソイドという、強い毒素を産生する細菌の毒素だけを取り出して無毒化し、ワクチンにしたものです。破傷風ワクチンは、1968年(昭和43年)から始まった三種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風・百日せき)に含まれていますので、定期接種で破傷風・ジフテリアワクチンを12歳の時に受けていれば、20代前半ぐらいまでは免疫がありますが、最終接種から10年経過したかたは、追加の接種をお勧めします。1回の追加接種で10年間有効な免疫がつかます。定期接種をしていないかたは、3回接種が必要です。

### 【接種対象年齢・回数・間隔等】

| 予防接種名 | 接種対象年齢又は対象者 | 回数 | 接種間隔                               | 当センター接種料金 |
|-------|-------------|----|------------------------------------|-----------|
| 破傷風   | 全年齢         | 3回 | 3～8週間で2回、その後6カ月以上(標準12～18カ月)の間隔で1回 | 1回 ¥4,000 |

### 接種後の注意

- ・接種当日の激しい運動は避けてください。
- ・接種部位に、発赤、いたみや硬結(しこり)をみることがありますが、特に心配はいりません。熱感あれば冷やして様子を見るようにしてください。
- ・特に異常な症状があった時には、主治医か休日診療所を受診し、その結果を当センター(Tel.06-6768-1486)へご連絡ください。

☆次頁の各ワクチン共通の説明書も、必ずご覧ください。

# 各ワクチン共通の説明書

## 1. 一般的な注意

- (1) 受ける予防接種について、この予防接種説明書をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解してください。わからないことは予防接種を受ける前に質問してください。
- (2) 接種当日は、母子健康手帳を持ってきてください。(成人で母子健康手帳のない場合は結構です。)
- ◎受けられる方がお子さんの場合については、保護者の方は以下の点についても特にご注意ください。
- (1) 当日は体温を計り、朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わった様子がないことを確認してください。接種に連れていく予定をしても体調が悪いときはやめてください。
- (2) お子さんの日頃の状態をよく知っている保護者の方がお付き添いください。
- (3) 予診票はお子さんを診察して接種する医師への大切な情報です。ありのままに記入してください。

## 2. 病気にかかった後の接種間隔

麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ等にかかった場合には、全身状態の改善を待って接種してください。医学的には、免疫状態の回復を考えて次の間隔をあけてください。

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 麻しん (治ってから 4 週間程度)                | 風しん、水痘、おたふくかぜ (治ってから 2~4 週間程度) |
| 突発性発疹、手足口病、伝染性紅斑 (治ってから 1~2 週間程度) | 普通感冒や上気道炎 (治ってから 1 週間程度)       |

## 3. 予防接種を受けることができない人

- (1) 明らかに発熱のある人 (明らかな発熱とは、接種場所で測定した体温が 37.5℃以上を指します。)
- (2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人。急性の病気で薬を飲む必要がある人は、その日は見合わせるのが原則です。
- (3) 予防接種の接種液の成分でアナフィラキシー (接種後 30 分以内に出現する呼吸困難や重いアレルギー反応のこと) を起こしたことがある人。
- (4) BCG 接種の場合は、外傷などによるケロイドができたことがある人。
- (5) その他、医師が接種不相当と判断した人。

## 4. 予防接種を受ける場合、医師とよく相談しなくてはならない人

次に該当すると思われる人は、かかりつけの医師がある場合には必ず前もって診ていただき、診断書又は意見書をもらってからご来院ください。


- (1) 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気及び発育障がいなどで治療を受けている人。
- (2) 予防接種後 2 日以内に発熱及び、全身性の発しんなどアレルギーを疑う症状がみられた人。
- (3) 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーの症状が出るおそれのある人。
- (4) 今までにけいれん(ひきつけ)をおこしたことがある人。
- (5) 過去に免疫状態を検査して異常を指摘されたことのある人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人。
- (6) 家族、接触のあった友だちなどに、麻しん(はしか)、風しん、おたふくかぜ、水痘(みずぼうそう)などの病気が流行している時で、予防接種を受ける本人がその病気にかかっていない人。感染して潜伏期間(症状が出ない期間)中の場合がありますので、かかりつけの医師と事前によく相談してください。
- (7) BCG 接種については、過去に結核患者と長期に接触があった人、結核に感染している疑いのある人。

## 5. 予防接種を受けた後の一般的な注意事項

- (1) 予防接種を受けたあと 30 分以内に、急な副反応がおこることがあります。接種後は安静に待機し、体調に変化がないかどうか様子をみてください。
- (2) 接種部位は清潔にしてください。入浴は差し支えありませんが、接種した部位をこすることはやめてください。接種当日はいつも通りの生活ができますが、はげしい運動は避けてください。
- (3) 高熱、おう吐、けいれん(ひきつけ)など特に異常な症状があった時には、主治医か休日診療所を受診し、その結果を当センターへご連絡ください。

## 6. 予防接種の接種間隔

異なる種類のワクチンを接種する際、注射生ワクチンと注射生ワクチンは 27 日以上間隔をあける必要があります(下記の図をご参照ください)。



| 予防接種の種類   |
|---|
| 【注射生ワクチン】<br>麻しん風しん混合(MR) 水痘(みずぼうそう)<br>流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 結核(BCG) 黄熱  |
| 【経口生ワクチン】 ロタウイルス(1 価・5 価)   |
| 【不活化ワクチン】<br>4 種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)<br>3 種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風)<br>2 種混合 (ジフテリア・破傷風) インフルエンザ<br>ポリオ 破傷風 日本脳炎 ヒブ(インフルエンザ菌 b 型)<br>A 型肝炎 B 型肝炎 狂犬病 髄膜炎菌<br>肺炎球菌(13 価・23 価) HPV(ヒトパピローマウイルス) |

◎同じ種類のワクチンを複数回接種する場合、それぞれのワクチンに定められた接種間隔があります。医師とよく相談したうえで接種を受けてください。